



भिण्डी खेती पात्रो (Okra Cropping Calendar)

महिना	बैशाख	जेष्ठ	आषाढ	श्रावण	भाद्र	आश्विन	कार्तिक	मंसिर	पौष	माघ	फाल्गुन	चैत्र
हप्ता	१ २ ३ ४	१ २ ३ ४	१ २ ३ ४	१ २ ३ ४	१ २ ३ ४	१ २ ३ ४	१ २ ३ ४	१ २ ३ ४	१ २ ३ ४	१ २ ३ ४	१ २ ३ ४	१ २ ३ ४
मौसम												



खेतको तयारी अवस्था



गोडमेल र उकेरा लगाउने अवस्था



मलखाद र सिंचाई व्यवस्थापन



दोस्रो मलखाद र सिंचाई व्यवस्थापन



बजारीकरणको लागि तयारी अवस्था

भिण्डी

रामतोरिया अर्थात् भिण्डी उष्ण तथा उपोष्ण क्षेत्रमा हुने र राम्रो उत्पादन लिनका लागि २५-३० डिग्री सेन्टिग्रेड तापक्रम उपयुक्त हुन्छ। बलौटे दोमट वा दोमट माटो जसको पि.एच. ६.०-७.५ सम्म हुन्छ यसको सफल खेतीका लागि राम्रो मानिन्छ।

लगाउने समय

क्षेत्र	लगाउने समय	जात
उच्च पहाड	बैशाख-जेष्ठ	पार्वती
मध्य पहाड	फाल्गुण-आषाढ	अर्का अनामिका
तराई	माघ-आषाढ	जया (F1) हाइब्रिड

जमिनको तयारी

गहिरो गरी ३-४ पटक राम्रोसँग खनजोत गरी एक रोपनीमा १००० के.जी. राम्रो पोकेको गोबरमल, ८ के.जी. यूरिया, ६ के.जी. डि.ए.पी. र ३ के.जी. म्युरेट अफ पोटास मध्ये यूरिया आधा भाग राखी बाँकी सम्पूर्ण मल जग्गा तयारीको बेला राम्ररी माटोमा मिलाउने। बाँकी आधा भाग यूरिया दुई चोटी १-१ महिनाको फरकमा राख्ने।

बीउ दर

समय (मौसम) अनुसार ५०० ग्राम देखि १००० ग्राम बीउ एक रोपनीको लागि प्रर्याप्त हुन्छ।

बीउ रोप्ने तरिका

हिउँदे - एक हार देखि अर्को हार - ५० से.मी.
बोट देखि बोटको दूरी - ३० से.मी.
गहिराई - २-३ से.मी.
वर्षे - एक हार देखि अर्को हार - १२० से.मी.
बोट देखि बोटको दूरी - ३० से.मी.

बीउ रोप्दा पानीमा २४ घण्टा भिजाई ओभाएपछि बीउलाई खेतमा रोप्नु पर्दछ जसले चाँडै उम्रन मद्दत पुऱ्याउँछ।



गोडमेल र सिंचाई

बीउ लगाएको १५ - २० दिनमा गोडमेल गरी चिस्यान कम भए नभएको एक दिन सिंचाई दिनु पर्छ। गोडाई पछि हल्का उकेरा लगाउनु पर्छ। दोस्रो गोडाई ३० - ४० दिनमा र तेस्रो गोडाई ५० - ६० दिनमा गर्दा राम्रो हुन्छ।

उत्पादन

बीउ रोपेको ५० - ६० दिनमा बाली टिप्ने बेला हुन्छ। प्रत्येक ३ - ४ दिनको अन्तरालमा साँभपख फल टिप्नु पर्छ। एक रोपनीमा सरदर ५०० - १००० के.जी. कलिला कोसा उत्पादन गर्न सकिन्छ।

बजार प्रबर्द्धन

कोसा टिप्दा ६ - ८ से.मी. लामो उत्तम हुन्छ। धेरै छिप्पीएको कोसा राम्रो मानिदैन। टाढाको बजारमा लग्दा कागजको कार्टुनमा राम्ररी प्याक गरी लग्नु पर्छ। करिब ७ - १० डिग्री सेन्टिग्रेड तापक्रम र ९० - ९५ प्रतिशत सापेक्षिक आर्द्रताको अवस्थामा कोसालाई ७ - १० दिन सम्म राम्ररी राख्न सकिन्छ।

मुख्य कीराहरू

छिर्के गवारो: यो कीरा नियन्त्रणको लागि साइपरमेथ्रिन २ मि.लि. प्रति लिटर पानीमा मिसाई छर्ने।

फड्के: यो कीरा नियन्त्रणको लागि मालाथियन ५ मि.लि. वा फेन्थलेरेट २ मि.लि. वा साइपरमेथ्रिन २ मि.लि. प्रति लिटर पानीमा मिसाई छर्ने।

मुख्य रोगहरू

नशा पहेँलने रोग: यो रोग लाग्न नदिन अवरोधी जात जस्तै पार्वती, अर्का अनामिका जात लगाउने। यसको नियन्त्रणका लागि मालाथियन ०.१ प्रतिशत वा नुभान ०.०४ प्रतिशत बीउ उम्रेको १५ - ३० दिनमा दुई पटक छर्ने।

धुलो दुसी रोग: यो रोग नियन्त्रणका लागि वेभिष्टिन ०.५ - १ ग्राम प्रतिलिटर पानीमा मिसाई छर्ने।

सन्दर्भ सामग्री

तरकारी खेती प्रविधि-२०६८, कृषि व्यवसाय प्रबर्द्धन तथा तथ्यांक महाशाखा, कृषि विकास मन्त्रालय, काठमाडौं।

